

# Ueber Ichneumoniden. (Hym.)

## Varietäten und neue Arten.

Von Professor H. Habermehl in Worms.

(Fortsetzung.)

### 43. *I. oscillator* Wsm.

- a.) ♂ var.: orbitis oculorum verticalibus, albo-maculatis, externis nigris; antennarum articulis tribus supra albo-pictis; thoracis lineolis solis ante alas sitis, tarsorum posticorum articulo 4o et basi quinti albis (Harreshausen 1 ♂, Sonnen 1889).
- b.) ♂ var.: sentelli 2 maculis apicalibus subconfluentibus albis (Hochheimer Park, 1 ♂, Juli 1901).

### 3. Gen. *Exephanes* Grav.

#### 1. *E. hilaris* Grav.

♂ var.: segmento 2o macula permagna, 3o macula apicali minore nigris ornatis, 4o toto nigro (Rosengarten, 1 ♂, 25. 6. 95).

### 4. Gen. *Amblyteles* Wsm.

#### 1. *A. fuscipennis* Wsm.

var.: orbitis oculorum facialibus et externis nigris (Michelstadt i. O., Hermannsberg, 1 ♂, 13. 5. 93).

#### 2. *A. repentinus* Grav.

var. *orbitalis* Kriechb.: „orbita faciali ex parte albida“. ♂ var.: similis var. *menstrualis* Grav., sed segmentis 3—5 obscure rufis, nigro-maculatis, 6 et 7 totis rufis (Harreshausen, 1 ♂, Juni 1893).

#### 3. *A. tauricus* Kriechb.

♀ var.: alarum stigmate fulvo-stramineo: lineolis ante et infra alas sitis albis; postpetiolo nigro, aciculato-rugoso, medio castaneo (Worms, 1 ♀, 3. 8. 1900). — Sehr ähnlich dem *A. repentinus*, von dem sich das Tier jedoch leicht durch die schwächeren Rückengruben sowie durch die Färbung der Beine unterscheidet. Von *A. melanocastanus* weicht es durch das weiße Schildchen, von *A. Devylderi* durch ein andersgefärbtes Flügelmal und durch

geringere Grösse, von *A. longimanus* durch den fehlenden weissen Innenrand der Augen sowie durch die Farbe des Flügelmals deutlich ab.

4. *A. divisorius* Grav.

$\sigma$  var.: ut var. 4 Hlgr., sed elipei margine basali albidio, antennarum scapo subtus punctulo pallido ornato (Rosengarten, 1  $\sigma$ , 17. 9. 90).

5. *A. Panzeri* Wsm.

$\sigma$  var.: 2 punctis facialibus cum orbita faciali subelegantibus flavis (Harreshausen, 1  $\sigma$ , Juli 1893).

6. *A. spectator* Fahr.

$\varnothing$  var.: postpetioli apice rufi, segmenti 2i macula media, 3i basi media macula triangulari nigra (Rosengarten, 1  $\varnothing$ , 27. 9. 90).

7. *A. camelinus* Wsm. — 8  $\varnothing$ , 1  $\sigma$  aus Puppen von *Vanessa Io*, 2  $\sigma$  aus solchen von *Vanessa Antiopa* erzogen.

a.) var. *rufomaculata* Kriechb.: 1  $\sigma$  aus einer Puppe von *Vanessa Antiopa* erzogen (s. *Kriechbanmer. Unters. Tischbein'scher Schlupfwesentypen*, E. N. 1894 p. 162). —

b.)  $\sigma$  var.: orbitis oculorum facialibus, 2 maculae elipei, puncto apicali sentelli flavis (Worms, 1  $\sigma$ , August 1891).

c.)  $\sigma$  var.: sentello apice flavo, segmentis 2—3 latera versus obscure rufis (1  $\sigma$  aus einer *Vanessa*-puppe (sp.?) erzogen).

8. *A. armatorius* Forst.  $\varnothing$  var.: Bei einem im Juli 1898 am Mummelsee gefangenem  $\varnothing$  tritt das Gelb des 2. und 3. Segments sehr zurück. Hier liegt offenbar ein Fall von Melanismus vor, dessen Ursache wahrscheinlich in der rauheren Temperatur des Fuudorts zu suchen ist.

9. *A. palliatorius* Grav.

a.)  $\sigma$  var.: sicut var. 3 Wsm., sed segmenti 6i macula basali nigra deficiente (Worms, 1  $\sigma$ , 12. 6. 96).

b.)  $\sigma$  var.: sicut spec. gen., sed femoribus posticis flavo- et fulvo-nigro variis (Harreshausen, 1  $\sigma$ , Juni 1895).

10. *A. trifasciatus* Grav.

$\varnothing$  var.: elipeo et macula media faciali castaneis; orbitis oculorum internis flavo-castaneis, mesonoto macula media et margine apicali segmenti 5i flavis, 6o et 7o apice flavo-castaneo maculatis (Hirsau, Schweinbachthal, 1  $\varnothing$ , Juli 1899).

11. *A. infactorius* Panz.

a.)  $\sigma$  var.: facie nigra, orbitis oculorum facialibus late, frontalibus anguste flavis (Harreshausen, 1  $\sigma$ , Juli 1893).

- b.) ♂ var.: sicut var. praeced., sed facie media puncto flavo pieta (Harreshausen, 1 ♂, 23. 7. 90).
12. *A. crispatorius* L.  
 a.) ♂ var.: sicut var. 1 Hlgr., sed antennarum flagelli di-midio basali extus ferrugineo (Harreshausen, 1 ♂, 1. 9. 94).  
 b.) ♂ var. 4-punctata nov. v.: sicut var. 1 Hlgr., sed meso-noto punctis 4 flavidis picto (Harreshausen, 1 ♂, 1. 9. 94).
13. *A. amatorius* Müll.  
 ♂ var.: segmentis 5—7 totis nigris (Schweigmatt i. s. Schwarzwald, 1 ♂, Juli 1900).
14. *A. hungariensis* Tischb.  
 ♀ var.: antennarum articulis 5—11 cum scapo subtus ferrugineis: capite, thorace, abdомine totis nigris (Schweigmatt, 1 ♂, Juli 1900). — Diese Varietät zeigt grosse Ähnlichkeit mit *A. castigator*, *camelinus* und *I. cessator*, von welchen sie sich jedoch durch die viel kleineren Rückengruben leicht unterscheiden lässt. Von *I. cessator* weicht sie außerdem durch die stumpfe Hinterleibsspitze ab. Von *A. subsericans* endlich unterscheidet sich unsere Varietät durch den in der Mitte bedeutend breiteren Hinterleib sowie durch die ganz schwarzen Fühler. Vielleicht liegt auch hier ein Fall von Melanismus vor.
15. *A. glaneatorius* Fabr.  
 ♀ var. *bivincta* Kriechb.: 9 ♂ („segmentis 4—5 fascia apicali, medio emarginata, albis“).
16. *A. uniguttatus* Grav.  
 a.) ♂ var.: sicut var. *Goedartii*, sed clipeo macula gemina signata (Harreshausen, 1 ♂, 1. 9. 91).  
 b.) ♂ var.: sicut var. *ignotus* Fonse., sed segmentis 2—3 totis rufis (Harreshausen, 1 ♂, 26. 7. 90).  
 c.) ♂ var.: clipei macula gemina, orbitis oculorum faciali-bus ex parte, postpetioli apice medio, segmenti 3i summo margine apicali flavis; segmenti 4i angulis basalibus ru-fis; 7o puncto pallido ornato: coxis posticis supra albido-maculatis (Harreshausen, 1 ♂, August 1893).  
 d.) ♂ var.: a var. praeced. differt: orbitis oculorum faciali-bus totis nigris; segmenti 3i vitta media postice dilatata fusca; coxis omnibus magis minnsve albido-maculatis (Harreshausen, 1 ♂, August 1893).  
 e.) ♂ var.: sicut var. *pratensis* Grav., sed postpetioli ma-cula media apicali et segmenti 5i margine apicali, medio interrupto, albidis (Harreshausen, 2 ♂, August 1893).  
 f.) ♂ var.: clipei puncto gemino, segmentorum 3—6 mar-gine apicali, medio interrupto, 7i macula media albidis;

coxis mediis subtus, posticis supra et subtus albido-maculatis (Harreshausen, 1 ♂, August 1893).

g.) ♂ var.: a var. *4-cingulatus* Grar. differt: segmentis 2 et 3 rufis, illo margine apicali albo-flavo, 4—6 marginibus apicalibus, 7 dimidio apicali albis: coxis postieis extus albo-vittatis (Hochheimer Park, 1 ♂, Juli 1900).

17. A. punctus Grav.

a.) ♂ var.: segmentis 2 et 3 apice magis minusve nigris (Harreshausen, 2 ♂, Juli 1893).

b.) ♂ var.: coxis anterioribus apiee albo-maculatis (Harreshausen, 1 ♂, August 1893).

18. A. oratorius Fabr.

a.) ♂ var.: *interruptus* Kriechb. („segmento 3 angulis apicalibus albo“).

b.) ♂ var.: segmenti 3i fascia apicali angusta bis interrupta (Harreshausen, 1 ♂, 1. 9. 91; Oberthal, 1 ♂, Juli 1901).

c.) ♂ var.: sicut var. *bipunctus* Berth., sed segmento 5 apice medio vitta transversa alba instructo (Worms, 1 ♂, 8. 8. 1900).

d.) ♂ var. *marginalis* nov. v.: metanoto 3 maculis albis ornato; segmentis 1—3 apice late, 4 et 5 medio anguste albo-marginatis (Rosengarten, 1 ♂, 22. 5. 1900).

5. *Aeolobus sericeus* (Wsm. ♀) ♂

Niger, nitidus, albosericens; antennis setaceis, flagello subtus dilute ferrugineo; palpis labialibus, mandibularum medio, clipeo — tuberculo dentiformi in medio apieis sito excepto — facie, orbitis frontalibus enim maxima parte exteriorum, macula minuta triangulari vertieis, antennarum scapo subtus. colli margine supero, propleurarum striga, linea longa ante alas lineolaque infra alas sita, scutelli lateribus, apicem versus confluentibus, coxarum anticarum dimidio apicali, latere interiore, medianarum summo apice magis minusve albidis; trochanterum antieorum latere antico apicem versus, femorum et tibiarum anteriorum latere antico pallide flavis: tarsorum antieorum apice, tarsisque mediis fuscescentibus; femorum posteriorum ima basi rufa; tibiis postieis — apice excepto — fulvescenti-rufescensibus, latere antico sordide testaceis: tarsis postieis fusci; segmenti medii area superomedia semielliptica; postpetiolo laevi einsque carinis 2 dorsalibus obsoletis; abdominis segmentis dorsalibus margine apicali summo rufescente; gastrocaelis nullis; segmentis ventralibus 2—4 plica elevata instructis; alis hyalinis, squamula et radicee fusci, areola deltoidea, nervum recurrentem in medio excidente. — Long. ca. 11 mm.

Die plastischen Merkmale sowie Grösse, Behaarung und Färbung dieses offenbar sehr seltenen Tieres stimmen mit dem von *Wesmael* (Tent. p. 139) beschriebenen, mir in natura aber unbekannten ♀, so gut überein, dass an der Zusammengehörigkeit beider Geschlechter wohl kaum gezweifelt werden kann. Das von *Brischke* beschriebene ? ♂ (Ichn. der Provinzen Ost- und Westpreussen p. 50) scheint mir nicht hierher zu gehören, da die kurze Beschreibung das charakteristische zahnartige Kuötchen in der Mitte des Vorderrandes des gerundeten Kopfschildes nicht erwähnt. Auch die Beschreibung der area posteromedia, welche nach *Brischke* breiter als lang ist, erweckt Zweifel an der Richtigkeit seiner Bestimmung.

Kopf hinter den Augen nur wenig verschmälert, kaum breiter als der Thorax. Körper überall mit der auch für das Weibchen charakteristischen feinen seidenartigen Behaarung versehen. Das Verdienst der richtigen Bestimmung des beschriebenen Tieres gebührt Herrn Professor *Brauns* in Schwerin, der es in einer Determinandensendung fand.

Beschrieben nach 1 ♂, das ich am 28. 6. 02 im Bürestädter Walde bei Worms erbeutete.

## 6. Gen. *Pyramidophorus* Tischb.

1. *P. flavoguttatus* Tischb. ♂ Niger; palpis pallidis; antennis setaceis, alboannulatis; labro, clipeo, facie fere tota, orbitis frontalibus et genalibus late, antennarum scapo subtus, vitta humerali, maculis meso- et metathoracis, scutello et postscutello, postpetioli margine apicali, segmentorum 2—4 et 7i maculis duabus apicalibus sensim angustioribus, coxarum maxima parte, femorum tibiarumque apice et latere autem, plia ventrali, tarsis, — articulorum apice excepto — puneto ad alarmum basin sito flavis; segmento medio spinis duabus armato, reticulato-rugoso, costis minus distinctis; area superomedia vix indicatea, subquadrata, supra regionem vicinam paullo prominente; gastrocaelis magnis, latis, transversis sulciformibus, minus profundis; thyridis perdistinctis; segmentis ventralibus 2 et 3 plia elevata instructis; alarum squamula et stigmate piecis; areola quadrangulari-trapezoidea; alis fuscedine leviter tintetis. — Long. 19 mm.

Der deutlich abgeplattete Petiolus sowie das fast pyramidale, steil nach hinten abfallende Schildchen lassen kaum einen Zweifel an der Zugehörigkeit des Thieres zu der von *Tischbein* aufgestellten, aber nur auf das Weibchen gegründeten Gattung *Pyramidophorus*.

Kopf quer verbreitert und hinter den Augen deutlich verschmälert. Oberlippe breit und gerundet; Kopfschild grade

abgestutzt. Mittelbrust ringsum gelb gefleckt. 2 fast zusammenfliessende kleinere Flecken befinden sich auf dem Mittelrücken, je ein grosser an der Basis der Vorderflügel, je einer an den Mittelbrustseiten und je einer am Vorderraude der Unterseite der Mittelbrust. Am Hinterrücken sind gelb: je ein Fleck über den hintersten Hüften, die beiden Dornen sowie ein Fleckchen unter der Basis der Hinterflügel. Das Mittelsegment zeigt eine netzigrunzelige Oberfläche mit sehr undeutlicher Feldernng und ist mit 2 kräftigen Dornen bewehrt. Das obere Mittelfeld erhebt sich fast höckerartig über die benachbarten Felder. Petiolus sehr stark abgeplattet und auf der Rückenseite mit 2 kräftigen nach hinten convergierenden Leisten versehen; Postpetiolus stark verbreitert, rechteckig und seine Oberfläche zerstreut punktgrubig. Zwischen dem 2. und 3. Hinterleibsring ist eine deutliche Einschnürung sichtbar. Der Rücken der vorderen Segmente erscheint infolge stärkerer und gröberer Punkteindrücke weniger glänzend als der Rücken der feiner punktierten hinteren Segmente.

Beschrieben nach einem ♂, das ich im Juli 1902 in der Nähe von Hinterstein im bair. Allgäu fing.

## 7. Gen. *Platylabus* Wsm.

### 1. *P. podatorius* Fabr.

- a.) ♂ var.: facie 2 punctis flavis infra basiu antennarum ornata (Worms, 1 ♂, 20, 6. 96).
- b.) ♂ var.: sicut var. 2 Wesm., sed facie infra basiu antennarum punctis duobus flavis ornata; coxis anticis albido-maculatis (Harreshausen, 1 ♂, 2. 9. 91).

### 2. *P. rufiventris* Wesm.

- ♂ var.: antennarum flagello toto nigro (Worms, 1 ♂, 31. 8. 96).

### 3. *P. leucogrammus* Wsm.

- ♂ var.: mesonoto et mesopleuris totis nigris (Oberthal, 1 ♂, Juli 1901). An vorliegendem Exemplar fehlen die 2 weissen Strichelehen des Mittelrückens sowie der weisse Punkt an den Mittelbrustseiten über den Mittelhüften. Sonst stimmt das Tier vollständig mit Wesmael's Beschreibung überein.

### 4. *P. rufbellus* Gmel. (= *P. Thedenii* Hlgr.)

- ♂ var.: segmentorum 2—6 marginibus apicalibus rufescentibus; orbita frontali ex parte angusta albida (Rossengarten, 1 ♂, 7. 9. 1901). — Der blassgelbe Fleck zwischen dem unteren Augenrand und der Kieferbasis ist sehr deutlich ausgebildet. Schildchen bis fast an die Spitze

gerandet, nach hinten steil abfallend. Oberes Mittelfeld sehr stark in die Breite gezogen, 3—4 mal breiter als lang. Spiegelzelle nach vorn vollkommen geschlossen, Rückengründen kaum sichtbar.

5. *P. albinns* Grav. Thoms. (Thomson Opusc. p. 2110). ♂ var.: clipeo ex parte labroque albidis; antennarum scapo subtus puncto basali albo ornato; segmentis 2 et 3 supra magis minusve infuseatis; tibiis posticis maxima parte nigris (Hirsau, 1 ♂, Juli 1899).

### 8. Gen. Phaeogenes Wsm.

1. *P. planifrons* Wsm.

♂ var.: segmentis 2—5 rufis (Hochheimer Park, 1 ♂, 17. 8. 1895).

2. *P. subulifer* Hlg. — Gleicht sehr dem ♀ von *P. melanogonus*, unterscheidet sich jedoch von demselben durch den mehr zugespitzten schwarzen Zahn der Hinterhüften sowie durch die ganz roten nach der Spitze zu gebräunten Fühler.

### 9. Gen. Acoenites Grav.

1. *A. fulvicornis* Grav. (*Phaenolobus Först.*)

♀ var.: seutello et postseutello apiee fulvo-signatis (Rosengarten, 1 ♀, 21. 6. 95).

2. *A. dubitator* Panz.

var.: tibiis postieis — basi excepta — magis minusve nigris (Worms, 1 ♀, 6. 6. 96; 1 ♂ 11. 6. 98; 1 ♀ 1. 6. 99; 1 ♀ 16. 6. 1900; 1 ♀ 7. 6. 01).

### 10. Gen. Rhyssa Grav.

1. *R. persuatoria* Linné.

♀ var.: metanoto nigro, 2 punctis eburneis ornato (Harshausen, 1 ♀, Juni 95).

### 11. Gen. Thaessa Holmgr.

1. *T. obliterata* Grav. ♀, Kriechb. ♂.

♀ var.: mesonoto toto nigro (Rosengarten, 1 ♀, 7. 10. 92). — Die von Kriechbaumer (E. N. 1887 Nr. 16) erwähnten Unregelmässigkeiten in der Ausbildung der Spiegelzelle des ♂ zeigen sich auch bei den mir vorliegenden Exemplaren.

## 12. Gen. Ephialtes Grav.

1. *E. insignis* nov. sp. ♀. — *Niger; pedibus rufis, posticorum tibiis tarsisque fuscouscentibus; alarum stigmate, radice ex parte, punto ante alas sito rufo-fulvis; areola magna, subtriangulari-trapezoidea; capite pone oculos angustato-rotundato; metathoracis lateribus satis longe albo-pilosus; abdomine elliptico; segmentis 1 et 2 latitudine sua longioribus, hoc arquato, latitudine sua duplo longiore, illo apicem versus sensim dilatato, 3o transverso, 4o subquadrato, 2—4 marginibus lateralibus distantibus; incisuris inter segmenta 2—3, 3—4 et 4—5 profundis, 3—5 tuberculis parum elevatis; nervulo interstitiali, nervulo longe ante medium fracto; terebrae valvulis distincte pilosis.* — Long. 22—30 mm.

Das stattliche Tier zeigt durch die tiefen Einschnitte zwischen den mittleren Hinterleibsringen grosse Ähnlichkeit mit *E. mesocentrus var. polydesmus* Kriechb., \*) unterscheidet sich jedoch von dieser Varietät sehr deutlich 1.) durch die mehr gestreckten Hinterleibsringe 1 und 2 und 2.) durch den quer verbreiterten 3. Hinterleibsring. Höchst auffallend sind die Rückenschilder des 2., 3. und 4. Segmentes gebildet. Dieselben zeigen nämlich stark nach aussen spreizende Seitenränder, ähnlich den seitlich abstehenden Rückenschilden der Larven der Käfergattung *Silpha*. Die Skulptur des Hinterrückens und des 1. Hinterleibsringes gleicht vollkommen der von *E. mesocentrus*, während die Farbe des Flügelmales mehr ins Bräunliche spielt. Eine Ausrandung an der Innenseite der Vorderschienen — nach Kriechbaumer charakteristisch für *E. mesocentrus* — vermag ich nicht zu erkennen.

Das hier beschriebene Weibchen wurde am 21. 9. 1901 an wurinstichtigem aufgeklaftertem Eichenholz am Rande des Bürstädtner Waldes gefangen.

## 13. Gen. Pimpla Fabr.

1. *P. instigator* Fabr.

♂ var.: sentello apice bis flavo-punctato (6 ♂; 1 ♂ aus einer Puppe von *Pieris brassicae* erzogen).  
(Fortsetzung folgt.)

---

\*) Herr Dr. Kriechbaumer hatte mir auf meinen Wunsch in hebenswürdigster Weise für längere Zeit die Benützung seines Manuscripts einer Monographie der Gattung *Ephialtes* gestattet.